

Τροφές που δεν πρέπει ποτέ να ταΐζετε τα ζώα σας:



Σοκολάτα, Καφές, Καφεΐνη: Περιέχουν ουσίες που ονομάζονται μεθυλξανθίνες, οι οποίες βρίσκονται στους σπόρους κακάο. Οι μεθυλξανθίνες μπορεί να προκαλέσουν εμετό, διάρροια, λαχάνιασμα, υπερβολική δίψα και ούρηση, υπερκινητικότητα, μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό, τρόμο, επιληπτικές κρίσεις ακόμα και θάνατο. Η μαύρη σοκολάτα και η κουβερτούρα είναι πιο επικίνδυνες από τη σοκολάτα γάλακτος.

Αβοκάντο: Περιέχουν Περσίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει εμετό και διάρροια στους σκύλους. Τα πουλιά και τα τρωκτικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη δηλητηρίαση από αβοκάντο που μπορεί να προκαλέσει καρδιακή συμφόρηση, δυσπννοια και συσσώρευση υγρού στο περικάρδιο.

Σταφύλια και σταφίδες: Μπορεί να προκαλέσουν νεφρική ανεπάρκεια.

Γάλα: Το γάλα και τα προϊόντα του μπορεί να προκαλέσουν διάρροια και πεπτικές διαταραχές.

Ωμό/ατελώς ψημένο κρέας, αυγά και κόκκαλα: Κίνδυνος μόλυνσης με *Salmonella*, *E. coli*, και προβλήματα στο δέρμα και το τρίχωμα.

Κρεμμύδια, σκόρδο, πράσα: Μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικό ερεθισμό και βλάβη των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι γάτες είναι πιο ευαίσθητες, αλλά οι σκύλοι κινδυνεύουν αν καταναλώσουν ικανές ποσότητες.

Αλκοόλ: Μπορεί να προκαλέσει έμετο, διάρροια, αταξία, κατάρρευση του κεντρικού νευρικού συστήματος, δύσπνοια, τρόμο, αυξημένη οξύτητα του αίματος, κώμα, ακόμη και θάνατο.

Ξηροί καρποί Macadamia: Μπορεί να προκαλέσουν αδυναμία, κατάθλιψη, έμετο, τρόμο και υπερθερμία στους σκύλους. Τα σημάδια εμφανίζονται συνήθως μέσα σε 12 ώρες από την κατάποση και διαρκούν περίπου 12-48 ώρες.

Ζύμη μαγιάς: Μπορεί να φουσκώσει και να προκαλέσει τη συσσώρευση αερίων στο πεπτικό σύστημα του κατοικίδιου ζώου σας. Αυτό μπορεί να είναι επώδυνο και να καταλήξει ακόμα και σε ρήξη του στομάχου ή των εντέρων.

Ξυλιτόλη: Χρησιμοποιείται ως γλυκαντικό σε πολλά προϊόντα, όπως τσίχλες, καραμέλες, αρτοσκευάσματα και οδοντόκρεμα. Η κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε ηπατική ανεπάρκεια και τα πρώιμα σημάδια περιλαμβάνουν έμετο, λήθαργο και απώλεια συντονισμού.

Αλάτι: Μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν υπερβολική δίψα και ούρηση ή δηλητηρίαση από ιόντα νατρίου σε κατοικίδια. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έμετο, διάρροια, κατάθλιψη, τρόμο, αυξημένη θερμοκρασία σώματος, επιληπτικές κρίσεις μέχρι και θάνατο.

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΚΙΝΗΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ**

Μεταφραση: Λάραλαμπάκης Γιώργος